

NHS



UK Health
Security
Agency

ٽي بي، بي
سي جي
واڪسين
او ستاسي ماشوم

immunisation
the safest way to protect your child

دغه لیفلیت د بی سی جی BCG
(Bacillus Calmette-Guérin) د واکسینو په
هکله دی کوم چي ستا ماشوم له نري رنځ (TB) څخه د
ژغورلو لپاره درکول کيږي.

بي سي جي BCG واکسین څه شی دی؟

بي سي جي واکسین د هغو باکتریاوو (جراثیمو) یو
کمزوری کړای شوی بڼه ده چي د نري رنځ سوب
گرځي. ځکه چي دا خو کمزوري کړای شوي وي نو نری
رنځ نه رامنځته کوي، مگر ستاسي له ماشوم سره مرسته
کوي چي د نري رنځ خلاف پیاوړی شي که چیري کوم
وخت ورسره مخامخ شي.

بي سي جي واکسین په ځانگړي توگه د وړو ماشومانو او
لویانو ماشومانو لپاره ډېر اغېزمن دي چي له سخت ډوله
نادر نري رنځ څخه یي وژغوري لکه تي بي منینجایټس
(چي د مغزو کرښې ورسره پرسپري)

نری رنځ (تي بي) (TB) څه شی دی؟

تي بي یو باکتوریايي لگېدنه ده، کوم چي عموماً پر سږیو
باندي اغېزه کوي مگر د بدن پر نورو برخو باندي هم اغېزه
کولای شي. د تي بي جراثیمو له لگېدلو ضروري نه ده
چي نری رنځ ورڅخه جوړ شي. دغه ناروغي ورو ورو
په بدن کښي خورېږي، او د علاماتو راڅرگندېدل یي څو
مياشتي وخت اخلي.

اکثر خلک چي تي بي یي اخیستلي وي خو د نري رنځ
ناروغي به کله هم پرې و نه لگېږي. په دغو خلکو کښي د
تي بي جراثیم د ټول ژوند لپاره غیرفعاله اوسي. په نورو
خلکو کښي (د بېلگي په توگه، هغه خلک چي کمزوری
مقاومت لري) د نري رنځ جراثیم فعال کېدلای شي او د تي
بي په ناروغی اوبنتلای شي. په دې هیواد کښي اکثر خلک
له درملني پسته په بشپړه توگه رغېږي، مگر په دې کار
باندي څو مياشتي وخت لگېږي.

د ټي بي علامات څه دي؟

ټي بي د بدن هره برخه باندې اغېزه کولای شي. علامات توپير لري او د يوه ماشوم د ناروغۍ علامات د يوه لوی کس له هغو څخه کېدلای شي چې بدل وي. ځکه چې ټي بي له يوه بل څخه اخیستل کېږي، نو دا مهمه ده چې تاسو په نورو کسانو کېنې دغه ناروغي وپېژنئ.

ته باید ډاکټر ته خبر ورکړې که ته، ستا ماشوم، ستا د کورنۍ کوم غړی، یا دوست دغه لاندې علامات ولري:

- پرلپسې توخی چې تر 2 اونيو زیات وخت پاته شي.
- تبه
- خولې کېدل، په تېره بیا د شپې مهال
- بې سوبه د وزن کمېدل
- یو ماشوم چې وزن یې وده نه کوي
- عمومي او غیر عادي د ستړیا احساس او ناروغيه کېدل
- په توخي کېنې د وینې راتلل

ټي بي څرنگه لکېږي؟

ته له هغه چا ټي بي اخیستلای شي چې لالمخه یې سږي یا غاړه په دغه رنځ اخته وي او چې زیات توخېږي. کله چې هغوی توخېږي، نو داسې واړه واړه څاڅکي شیندي چې باکټریا لري. که یوڅوک دغه څاڅکي له ساه سره واخلې نو هغه هم دغه ناروغي اخیستلای شي. هغه وخت په ناروغۍ د اخته کېدلو خطر وې کله چې له يوه اخته شوي کس سره په بند ځای کېنې په گډه واوسېږي، د بېلگې په توگه په يوه کور کېنې ورسره اوسېدل.

تي بي ڄومره عامه ده؟

په 1950 کلونو کښې په برتانيې کښې د نري رنځ 50,000 نوې پېښې به هر کال کېدلې. اوس دغه شمېره هر کال فقط 5,000 ته راتپته شوې ده. نو که تا ته د تي بي د لگېدلو امکان کم دی، خو بيا هم هرچاته پکار ده چي د تي بي د علاماتو په باره کښې اگاهي ولري. دا ځکه ډېره مهمه ده چي تي بي په ټوله نړۍ کښې خوره وړه ده.

په هغو خلکو کښې د دغي ناروغۍ خطر زيات دی چي په داسي هيوادونو کښې اوسېدلي وي يا يې کار کړی وي چېرته چي د تي بي کچه ډېره لوړه ده. د هغو کورنيو ماشومان هم کېدلای شي د خپلې کميونټي له اخته شويو کسانو سره نيژدې تماس ولري، هم په برتانيې کښې او هم په خپل اصلي هيواد کښې.

زما ماشوم ته ولي بي سي جي ورکول کېږي؟

لکه د نورو هيوادونو په شان، په برتانيې کښې هم بي سي جي هغو ماشومانو ته ورکول کېږي چي له يو داسي کس سره کېدلای شي وخت تېروي چي تي بي لري. په دغو کښې هغه ماشومان شامل دي چي لوړې کچې د تي بي په سيمو کښې اوسېږي يا هغه ماشومان چي مورپلا يا نيکه او نيا يې د لوړې کچې د تي بي له سيمو څخه وي. (د نورو معلوماتو لپاره وگورئ 7 مخ)

زما ماشوم څرنگه خوندي ساتل کېږي؟

ستا ماشوم ته به د کين لاس په مټه باندي بي سي جي واکسين ورکول کېږي.

واکسين ژر له زوکړې وروسته ورکول کېږي، عموماً له زوکړې 28 روځي پسته.

ايا کومي اړخيزې اغېزې لري؟

له پيچکاري سملاسي وروسته به يوه ټيکه راڅرگنده شي. چې دا څرگندوي چې پيچکاري په سمه توگه وهل شوي ده.

د پيچکاري له دوو څخه بيا تر شپږو اونيو پوري به يو کوچنی داغ راڅرگند شي. کېدلای شي چې تريوڅو روڅو پوري بڼه خوړ ولري، مگر که يې پټ و نه ساتی نو سوکه سوکه به پخپله جوړ شي. کېدلای شي چې يو داغ پاته شي. دا عادي وي.

کله کله داسي هم کېدلای شي چې ستا د ماشوم په هغه ځای کېني يو لږ ژور زخم جوړ شي چېرته چې پيچکاري ورته لگېدلي وي. که چيري دا يو بهېدونکی نو وي نو پکار ده چې پټ کړل شي، وچه پټی وکاروی - خو پلستر هيڅ کله نه - ترڅو وچ خيړ ونيسي. د دغه زخم به رغېدلو کېدلای شي څو مياشتې وخت ولگېږي.

که چيري ته پرېشان يې يا فکر کوي چې زخم دي گزک نيولی دی، نو له ډاکټر سره وگوره.



آيا داسي کومه وجه شته چي زما ماشوم بايد بي سي جي واکسين وا نخلي؟

د نورو واکسينو په شان، دغه پيچکاري هم بايد هغه وخت و نه وهل شي يا بايد وځنډول شي که:

- ستا ماشوم لوړه تبه لري.
- ستا ماشوم د پوستکي په يوې عمومي ناروغۍ اخته وي. (که ايگزېما يعني سپونۍ پرې لگېدلی وي، نو پيچکاري به پر هغه ځای ورته وهل کپري چي خوږ نه وي.)
- کله کله، هغه ماشومان چي مقاومت يې کمزوری وي، نو د واکسينو باکټريا يې په جدي توگه ورلگېدلای شي.
- که ستا ماشوم کمزوری مقاومت لري يا ته داسي فکر کوي نو دا خبره ډېره مهمه ده چي نرس يا ډاکټر پرې خبر کړي. د بېلگې په توگه:
- که ماشوم د کپنسر يا نورو سختو ناروغيو له لاسه تر درملني لاندي وي.
- که د ماشوم مور ته د اميدوارۍ په مهال ايمونوسپريسيو بيالوجيکل تهيراپي ورکول شوي وي.
- که کورنۍ د مقاومت د ستونزو يو تاريخچه لري (لکه ايچ آي وي، شديد مشترک مدافعتي کمزوري يا ايس سي آبي ډي)
- ماشومان چي ايس سي آبي ډي لري يا کډلای شي چي و يې لري



کوم ماشومان بي سي جي ته اړتيا لري

که چېرې په يوې داسې سيمې کېنې نه اوسې چېرته چې ټولو ماشومانو ته بي سي جي ورکول کېږي نو بيا هم ستا ماشوم کېدلای شي چې دغه واکسين ته اړتيا لري.

که دغو لاندینيو پوښتنو کېنې يوې ته هم ستا ځواب 'هو' وي، نو هر ورو له خپل ډاکټر يا نرس څخه د خپل ماشوم لپاره د بي سي جي په باره کېنې پوښتنه وکړه.

- ايا دغه ماشوم، د ماشوم مور، پلار، يا نياڼيکه، يا کوم بل کس چې له تاسې سره اوسېږي، له يوه داسې هيواد څخه دي چېرته چې د تي بي کچه لوړه ده؟
- آيا تاسو يا ستاسو ماشوم به دغو هيوادونو کېنې په کوم يو کېنې به اوسې او يا به له دوستانو او خپلوانو سره پاتې کېږي؟
- آيا داسې کوم څوک شته چې له تا سره اوسېږي، يا ستاسو له ماشوم سره زيات وخت تېروي، چې اوس تي بي لري يا يې پخوا لرله؟

د تي بي د لوري کچې هيوادونو شمېرې له روغتيا نړۍ وال سازمان (ډبليو ايچ او) څخه اخيستل کېږي پر:

www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people

آيا زه په كوم بل شي باندي پوهېدلو ته اړتيا لرم؟

ستا ماشوم عادي واكسين د 8 اونيو په عمر كښي شورو كولاى شي دا پروا نه لري چي بي سي جي يې څه وخت اخيستلى دي. ته بايد ډاډ تر لاسه كړي چي ستا ماشوم ته پر هممهغه لاس كښي بله پيچكاري ونه وهل شي پر كوم باندي چي د بي سي جي ورته وهل شوې وي كم تركمه تر 3 مياشتو پوري؛ كنى د دغه ځاى په غډودو كښي به پارسوب پيدا شي.

دغه ډاډ تر لاسه كړه چي د بي سي جي واكسينو ريكارډ ستا د ماشوم په ځانگړي چاپلډ هيلته ريكارډ (سور كتاب) كښي د راتلونكي



وخت د حوالي لپاره وليكل شي.

نور معلومات

كه تاسي د تي بي، يا بي سي جي واكسينو يا نورو واكسينو باره كښي نور معلومات غواړئ نو له خپل ډاكټر، هيلته ويزيټر، دايمي يا نرسې سره خبرې وكوئ، يا زموږ وېبپاڼي ته ورشئ

www.nhs.uk/conditions/vaccinations/bcg-tuberculosis-tb-vaccine

په ياد لره، د تي بي درملنه
زياته وخت نيسي، خو مخنيوى
يې اسان دى.



© Crown copyright 2021

2021SCTBPAS Pashto 75 2p Sept 2021 (APS).

لطفاً د طبي خپرونو اړد كولو يا داوڼود كولو لپاره دلته ورشئ:

www.healthpublications.gov.uk

:يا زنگ ووهئ: 0300 123 1002، 0300 123 1003 (سهار 8 بجو څخه د ماښام 6 پوري، له دوشنبې تر جمعې)

www.nhs.uk/vaccinations